

# 腹腔內感染治療準則

柯文謙

成大醫院感染科

臨床處理複雜性腹腔內感染，不論是內科或是外科醫師，國內或國外都是充滿挑戰：疾病嚴重度差異性大、病患潛在疾病分歧性高、致病原抗藥性變化大、就醫時序先後不同，這些因素都影響著這種疾病臨床處置方式。

外科手術或放射科經皮引流，再加上適當抗生素治療是主要腹腔內感染處理模式。上述因素中，除了引流方式外，就屬抗生素使用適當性提高，是臨床醫師可以介入改善的項目。由於腹腔內感染病原種類多樣性高，區域性病原菌種類與抗藥性的監測，與用藥準則設定，對於第一線醫療照護人員選擇適當有效的抗生素種類是非常重要依據。一般而言，抗生素選擇會依照感染部位、生命跡象、社區或醫療機構相關感染、感染病原種類、患者免疫程度、肝/腎衰竭情形、先前抗生素使用病史等等，多種因素考量。當然抗生素使用前微生物檢驗完整性，亦是十分重要。這些培養報告對於治療療效不佳個案，後續處理方式，亦需依此結果，改變治療藥物。對於複雜性腹腔內感染，如何選用適當抗生素，將是說明重點。