




trulicity®
dulaglutide once-weekly injection

×



REWIND®
Trulicity CV Outcomes Trial

首針控糖 一級護心

First Injection, Primary Prevention.

The Truly
Simplicity Forum





台北 新板希爾頓 1樓 吉祥B廳

時間	主題	講者	主持人
18:00-18:30	報到		
18:30-18:50	Opening : REWIND the CardioClock in DM- Trulicity with CV indication launch		振興醫院 蔡世澤 醫師
18:50-19:30	Considering the First Injection in T2D Journey	亞東醫院 江珠影 醫師	
19:30-19:40	Break		
19:40-20:30	REWIND - Primary Prevention of CVD in T2D	忠孝醫院 廖國盟 醫師	
20:30-21:20	Panel Discussion : • REWIND to the Origin: T2D Care with Qualified HbA1c Control • REWIND the Future: Advanced Deployment for T2D patient without CVD		All
21:20-21:30	Closing		振興醫院 蔡世澤 醫師



高雄漢來 15樓 會展廳



時間	主題	講者	主持人
09:00-09:30	報到		
09:30-09:50	Opening : REWIND the CardioClock in DM- Trulicity with CV indication launch		高雄長庚 陳榮福 醫師
10:50-10:30	Considering the First Injection in T2D Journey	奇美醫院 葉乃誠 醫師	
10:30-10:40	Break		
10:40-11:30	REWIND - Primary Prevention of CVD in T2D	奇美醫院 田凱仁 醫師	
11:30-12:20	Panel Discussion : • REWIND to the Origin: T2D Care with Qualified HbA1c Control • REWIND the Future: Advanced Deployment for T2D patient without CVD		All
12:20-12:30	Closing		高雄長庚 陳榮福 醫師



台中 林酒店 6樓 仙侶廳



時間	主題	講者	主持人
14:00-14:30	報到		
14:30-14:50	Opening : REWIND the CardioClock in DM- Trulicity with CV indication launch		彰化基督教醫院 杜思德 醫師
14:50-15:30	Considering the First Injection in T2D Journey	中山附醫 王威傑 醫師	
15:30-15:40	Break		
15:40-16:30	REWIND - Primary Prevention of CVD in T2D	中山附醫 楊宜瑱 醫師	
16:30-17:20	Panel Discussion : • REWIND to the Origin: T2D Care with Qualified HbA1c Control • REWIND the Future: Advanced Deployment for T2D patient without CVD		All
17:20-17:30	Closing		彰化基督教醫院 杜思德 醫師

易週糖® 注射劑 1.5 毫克/0.5 毫升、0.75 毫克/0.5 毫升

TRULICITY® (dulaglutide) injection 0.75 mg/0.5 mL, 1.5 mg/0.5 mL

單次劑量注射筆Single-Dose Pen

適應症:

- 第二型糖尿病。
- 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病或多項心血管風險因子的成年病人，可降低重大不良心血管事件的風險。

使用方法:

- 建議起始劑量為0.75 mg 每週一次，為更佳的血糖控制，此劑量可增加為1.5 mg 每週一次。最大的建議劑量是1.5 mg 每週一次。
- 可在一天當中的任何時間，不須考慮進食與否，以皮下注射方式注射在腹部、大腿或上臂。若錯過一劑，且距離下一次預定給藥時間至少3日(72小時)，則應儘快使用。若距離下次預定給藥時間未滿3日，則應跳過錯過的劑量，於原本預定的日期給予下一次劑量。上述兩種情況下，病人均可恢復原本每週一次的給藥時程。若有需要，可以改變每週給藥的日子，但前後兩劑之間隔必須為3日以上。
- 當開始使用時，需考慮將併用之促胰島素分泌藥物(如Sulfonylurea)或胰島素之劑量降低，以降低低血糖的風險。

使用禁忌:

注意事項:

- 禁用於個人或是家族有甲狀腺髓質癌(MTC)病史病人或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症病人(Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2, MEN 2)。
- 對於有胰臟炎病史的病人，請考慮使用其他降血糖藥物。
- 併用其他促胰島素分泌劑(例如，sulfonylureas)或是胰島素會增加低血糖的風險。在此情況下，病人可能需要降低sulfonylurea或胰島素的劑量來降低發生低血糖的風險。
- 不可用於之前對易週糖®有過敏反應的病人。
- 對於有嚴重腸胃道不良反應之腎功能不全病人，應要監測其腎功能。
- 不建議使用於嚴重胃腸疾病(包括嚴重胃輕癱)的病人。
- 有糖尿病視網膜病變史的病人應監測其糖尿病視網膜病變的狀況。

詳細資料、不良反應、警語與注意事項等請參照易週糖®藥品說明書。

易週糖®注射劑 0.75 毫克/0.5 毫升 衛部菌疫輸字第 000979號

易週糖®注射劑 1.5 毫克/0.5 毫升 衛部菌疫輸字第000978號

台灣禮來股份有限公司

台北市復興北路365號11樓